

Link do produktu: <https://paszowy.pl/grzybnia-kozlarz-czerwony-grzyby-lesne-p-1285.html>



Grzybnia Kozłarz Czerwony Grzyby Leśne

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5906874355077

Opis produktu

Kozłarz czerwony jest **wyśmienitym grzybem jadalnym**, szczególnie smaczne są jędrne, młode owocniki. Grzyb ten wykorzystywany jest do wielu potraw - sosów, zup, jako aromatyczny dodatek do mięs i przetworów, świetnie nadaje się do duszenia i suszenia. Jego wartości smakowe i aromatyczne są równe wartościom najlepszych borowików - prawdziwków. **Ma łagodny smak i delikatny grzybowy zapach.** Średnica dochodzi do 20 cm.

Występowanie

Spotkać go można od czerwca do końca listopada - owocniki rosną nawet podczas mocnych przymrozków. Żyje w mikoryzie z osiką i topolą. Rośnie w lasach oraz zaroślach, pod osikami i topolami, także poza lasem.

Porady dotyczące hodowli.

Aplikować grzybnię od połowy kwietnia do października. **W miejscu aplikacji grzybni powinny rosnąć drzewa liściaste najlepiej osika lub topola, korzystnie jest gdy drzewa są stosunkowo młode.** Jako podłoże zaleca się stosować gotową ziemię ogrodniczą z dużą zawartością torfu.

Opakowanie: 10 g

Uprawa i pielęgnacja

1. Wokół pnia drzewa wykopać 3 otwory o średnicy 30-40 cm i głębokości 15 cm. Otwory wykopać w odległości 0,5 – 5m (ok. 10 średnic pnia) od pnia drzewa.
2. Otwory wypełnić do połowy przygotowanym podłożem, następnie umieścić grzybnię w proporcji 1/3 opakowania na każdy otwór. Zasypać podłożem do poziomu gruntu i mocno ubić.
3. Miejsce aplikacji starannie podlać, 1 wiadro wody wokół każdego dołka.
4. Przykryć warstwą liści, igieł, mchu, gałązek itp. z lasu.
5. Dobry wpływ na rozwój grzybni ma zastosowanie roztworu cukru (10 g na 10 litrów wody)
6. W okresie owocowania, w przypadku braku opadów zaleca się cykliczne zwilżanie gleby.

Owocowanie

W sprzyjających warunkach grzyby mogą pojawiać się w pierwszym lub drugim roku po posadzeniu grzybni.

Grzybnia powinna owocować 3-4 lata.

Zapraszamy do zakupów;)

Sproszkowana grzybnia biologiczna na ziarnie. **Prawdopodobieństwo plonowania 85% - 87%**

Amatorska uprawa mikoryzowych grzybów leśnych (Mikoryza - zjawisko współżycia grzybów z korzeniami drzew)

Nie gwarantuje rezultatu, ponieważ plonowanie grzybów jest silnie uzależnione od pogody oraz wielu innych czynników. Do ich uprawy należy stworzyć warunki najbardziej zbliżone do naturalnych oraz aplikować grzybnie zgodnie z instrukcją. Przy wystąpieniu odpowiednich warunków klimatycznych, możemy w stosunkowo krótkim czasie liczyć na dobre wyniki.