

Link do produktu: <https://paszowy.pl/grzybnia-kozlarz-pomarańczowozółty-grzyby-lesne-p-1284.html>



Grzybnia Kozlarz Pomarańczowozółty Grzyby Leśne

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5906874355084

Opis produktu

Kozlarz pomarańczowozółty jest **wyśmienitym grzybem jadalnym, szczególnie smaczne są jędrne, młode owocniki**. Grzyb ten wykorzystywany jest do wielu potraw - sosów, zup, jako aromatyczny dodatek do mięs i przetworów, świetnie nadaje się do duszenia i suszenia. Jego wartości smakowe i aromatyczne są równe wartościom najlepszych borowików - prawdziwków. Ma łagodny smak i delikatny grzybowy zapach. Średnica dochodzi do 20 cm.

Występowanie

Występuje pospolicie od lata do jesieni. Rośnie najczęściej pod brzożami, tworzy bowiem mikoryzę z tym gatunkiem drzew. Znaleźć go można w lasach liściastych, często także poza lasem na rzadko zadrzewionych łąkach czy skwerach z brzożami, także w licznych grupach. Podobny do swojego krewniaka Kozlarza czerwonego i równie smaczny.

Porady dotyczące hodowli.

Aplikować grzybnię od połowy kwietnia do października. **W miejscu aplikacji grzybni powinny rosnać drzewa liściaste najlepiej brzoza, korzystnie jest gdy drzewa są stosunkowo młode.** Jako podłoże zaleca się stosować gotową ziemię ogrodniczą z dużą zawartością torfu.

Opakowanie: 10 g

Uprawa i pielęgnacja

1. Wokół pnia drzewa wykopać 3 otwory o średnicy 30-40 cm i głębokości 15 cm. Otwory wykopać w odległości 0,5 – 5m (ok. 10 średnic pnia) od pnia drzewa.
2. Otwory wypełnić do połowy przygotowanym podłożem, następnie umieścić grzybnię w proporcji 1/3 opakowania na każdy otwór. Zasypać podłożem do poziomu gruntu i mocno ubić.
3. Miejsce aplikacji starannie podlać, 1 wiadro wody wokół każdego dołka.
4. Przykryć warstwą liści, igieł, mchu, gałązek itp. z lasu.
5. Dobry wpływ na rozwój grzybni ma zastosowanie roztworu cukru (10 g na 10 litrów wody)
6. W okresie owocowania, w przypadku braku opadów zaleca się cykliczne zwilżanie gleby.

Owocowanie

W sprzyjających warunkach grzyby mogą pojawiać się w pierwszym lub drugim roku po posadzeniu grzybni.

Grzybnia powinna owocować 3-4 lata.

Zapraszamy do zakupów;)

Sproszkowana grzybnia biologiczna na ziarnie. **Prawdopodobieństwo plonowania 85% - 87%**

Amatorska uprawa mikoryzowych grzybów leśnych (Mikoryza - zjawisko współżycia grzybów z korzeniami drzew)

Nie gwarantuje rezultatu, ponieważ plonowanie grzybów jest silnie uzależnione od pogody oraz wielu innych czynników. Do ich uprawy należy stworzyć warunki najbardziej zbliżone do naturalnych oraz aplikować grzybnie zgodnie z instrukcją. Przy wystąpieniu odpowiednich warunków klimatycznych, możemy w stosunkowo krótkim czasie liczyć na dobre wyniki.