

Link do produktu: <https://paszowy.pl/lubisan-25-kg-sucha-sciolka-p-29.html>



Lubisan 25 kg sucha ściółka

Cena	118,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	A5C6-3528A_20200123204714

Opis produktu

Preparat Osuszający

Preparat przeznaczony do osuszania pomieszczeń hodowlanych. Rezeptura oparta na składnikach mineralnych sprawia, że Lubisan Sucha Ściółka jest doskonałym absorbentem nadmiaru wilgoci a tym samym środkiem **profilaktyki chorób odśrodkowych** takich jak:

- Biegunki
- Kolibakteriozy
- Choroby układu oddechowego
- Choroby, łap, racic itp.

Preparat posiada w swoim składzie substancje pochłaniające mocznik i gazy, redukując ich emisję do atmosfery. LUBISAN SUCHA ŚCIÓŁKA poprawia wartość nawozową obornika oraz redukuje szkodliwe wypłukiwanie azotu i fosforu do wód gruntowych. **Preparat przeznaczony jest do stosowania w obecności zwierząt, nie jest drażniący ani toksyczny.** Preparat nie zawiera w swoim składzie żadnych substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Z uwagi na swoje właściwości produkt jest szczególnie zalecany do stosowania w intensywnej hodowli drobiu (brojlery, indyki) – zdecydowanie obniża wilgotność ściółki przyczyniając się do zmniejszenia częstotliwości występowania chorób stóp oraz obniżenie emisji amoniaku i siarkowodoru.

Stosowanie

LUBISAN SUCHA ŚCIÓŁKA należy stosować regularnie na powierzchnię całego pomieszczenia szczególnie w miejscach o nadmiernym zawilgoceniu, w kojach porodowych, w okolicach poidel, na ściółkę, na maty, wokół mat, bezpośrednio na powierzchnię osuszaną bądź ściółkę 1 raz na 7 dni. W przypadku szczególnie zawilgoconych powierzchni, zabieg można powtarzać częściej nawet codziennie, jeśli jest taka potrzeba.

BYDŁO- stosować w dawce 50-100 g/m² na legowiska, maty oraz wokół mat. Pod maty stosować preparat do suchej dezynfekcji LUBISAN

TRZODA- stosować w kojcach porodowych a także na ściółkę w dawce 50 -100 g/m² . Szczególne zastosowanie do suchej kąpieli prosiaków.

DRÓB – stosować na całej powierzchni budynku w dawce 50 – 100 g/m² , w miejscach zawilgoconych narożniki, okolice linii pojenia zwiększyć dawkę do 100 – 150 g/m². W hodowli ściółkowej zaleca się stosowanie dodatkowego preparatu dezynfekującego LUBISAN przed położeniem ściółki i bezpośrednio na oczyszczoną posadzkę w dawce ok 100 g/m²

KRÓLIKI - nanosić na dezynfekowaną powierzchnię po uprzednim oczyszczeniu mechanicznym lub bezpośrednio na ściółkę przez równomierne posypywanie w dawce 50 g/m² na klatki. W hodowli ściółkowej przed położeniem ściółki zaleca się stosowanie dawki maksymalnej 100g/m²

PRZECHOWYWANIE – preparat należy przechowywać w suchych pomieszczeniach z dala od wilgoci, od środków spożywczych i poza zasięgiem dzieci. Odpad produktu można po wymieszaniu z nawozem organicznym aplikować na pola.

W celu podniesienia skuteczności profilaktyki zaleca się wymienne stosowanie preparatu LUBISAN SUCHA DEZYNFEKCJA