

Link do produktu: <https://paszowy.pl/srodek-owadobojczy-na-ziemiorki-maczliki-neemazal-ts-15-ml-p-1529.html>



Środek OWADOBÓJCZY na ziemiórki mączliki NeemAzal T/S 15 ml

Cena	37,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5907102013752

Opis produktu

NeemAzal T/S 15ML SUMIN Efektywny insektycyd, zawierający naturalny ekstrakt z nasion miodli indyjskiej (Azadirachta indica) o szerokim spektrum działania – na szkodniki gryzące, ssące oraz minujące.

Substancja aktywna: azadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów) – 9,8 g/l (1,0%)

NeemAzal®-T/S zawiera substancję aktywną pozyskaną z ziaren tropikalnego drzewa Neem – miodli indyjskiej. Opatentowany i dokładnie kontrolowany proces pozyskiwania substancji aktywnej – **azadyrachtyny** – **gwarantuje jej wysoką jakość oraz stabilność**.

NeemAzal®-T/S stał się integralną częścią biologicznej ochrony upraw i w większości krajów gdzie jest dostępny stanowi podstawę programów ochrony **plantacji ekologicznych**, w szczególności jabłoni (wysoka skuteczność zwalczania mszycy jabłoniowej i jabłoniowo babkowej) oraz ziemniaków (ochrona przed stonką ziemniaczaną).

wysoka, sprawdzona efektywność, **działa na szkodniki gryzące, ssące oraz minujące** dopuszczony do **zastosowania w uprawach ekologicznych** ogranicza żarłoczność larw i postaci dorosłych (również chrząszczy) ogranicza płodność szkodników działa włącznie na roślinie pozostaje w liściu nawet do 10 dni! nie wykazuje ostrej toksyczności wobec pszczół, trzmieli i wielu innych pożytecznych organizmów NeemAzal®-T/S wykazuje działanie żołądkowe. W przeciągu kilku godzin od przeprowadzenia zabiegu szkodniki zaprzestają żerowania. Preparat działa hamująco na żarłoczność i rozwój larw oraz zwiększa ich śmiertelność. U chrząszczy widoczny jest spadek żarłoczności oraz płodności oraz w mniejszym stopniu śmiertelność. Po kilku dniach populacja nie rozwija się i załamuje. Kolonie mszyc są przez pewien czas widoczne jednak larwy nie rozwijają się.

Na roślinie działa włącznie – co zwiększa efektywność zwalczania szkodników minujących. Zakres stosowania:

- **Jabłoń** – mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowa, miodówki, gąsienice piędzika przedzimka, gąsienice motyli namiotnikowatych, gąsienice zwójków – Termin stosowania: do fazy BBCH 69 (koniec fazy kwitnienia: wszystkie płatki opadły).
- **Ziemniak** – stonka ziemniaczana – Termin stosowania: środek stosować w czasie obecności w uprawie larw pierwszych stadiów rozwojowych (L1-L3). Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska (w polu) – owady ssące (z wyjątkiem: Heteroptera – pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące.
- **Pomidor, ogórek, bakłażan** (w polu i pod osłonami) – owady ssące (z wyjątkiem: Heteroptera – pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące.
- **Zioła za wyjątkiem szczypiorku** (w polu i pod osłonami) – owady ssące (z wyjątkiem: Heteroptera – pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące. Szpinak (w polu) – owady ssące (z wyjątkiem: Heteroptera – pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące.
- **Winorośl** – mączniki do fazy BBCH 61 (początek fazy kwitnienia) Filoksera winiec – forma liściowa, chrabąszcz majowy (ograniczenie liczebności szkodnika).
- **Rośliny ozdobne** (w polu, pod osłonami, zieleń miejska) za wyjątkiem gruszy i roślin iglastych, do wysokości 50 cm – owady ssące, gryzące oraz minujące, mączliki. Szparag (w polu) – Owady ssące, owady gryzące.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.